

VÝŽIVOVÝ DOPLNOK

TriZin[®] SR

60 tabliet s postupným uvoľňovaním

Trojkombinácia vysokovstrebateľného organického zinku s obsahom 25 mg v 1 tablete.

Zinok je esenciálny mikroelement, ktorého nedostatkom trpí približne 30 % celosvetovej populácie. Zinok prispieva k normálnej funkcii **imunitného systému**. Zinok sa podieľa na procese delenia buniek a prispieva k normálnej syntéze DNA a bielkovín a prispieva k ochrane buniek pred oxidačným stresom. Okrem toho zinok napomáha k udržaniu normálneho stavu **vlasov, pokožky a nechtov**.

Organicky viazaný zinok umožňuje efektívnejšie vstrebávanie v porovnaní s anorganickými soľami zinku. Najdokonalejšie vstrebávanie zinku predstavujú cheláty zinku (napr. bisglycinát zinočnatý). Vďaka svojej molekulárnej štruktúre sú oveľa menej ovplyvňované inhibítormi príjmu zinku zo stravy (fytáty, polyfenoly, vláknina). Chelátované formy zinku majú tiež najmenej (gastrointestinálnych) nežiaducich účinkov.

Zinok sa vstrebáva v tenkom čreve, ktoré má 3 hlavné časti a každá z nich má rôznu schopnosť **absorpcie** zinku. Vstrebávanie ovplyvňuje mnoho faktorov ako kyslé prostredie žalúdka, strava, či mikrobióm čreva. Efektívnym riešením je lieková forma s postupným uvoľňovaním, ktorá je rezistentná voči kyslému prostrediu žalúdka a poskytuje bezpečný transport tablety až do miesta vstrebania – tenkého čreva.

Práve takéto tablety obsahuje produkt **TriZin[®] SR**.

DÁVKOVANIE:

Dospelí a dospelievajúci (12 - 17 rokov):

Odporúčaná dávka je 12,5 (125% RVH*) - 25 (250% RVH*) mg denne (čo zodpovedá 1/2 až 1 tablete **TriZin[®] SR**).

Deti (6 - 11 rokov):

Dávkovanie je potrebné konzultovať s lekárom alebo lekárnikom.

TriZin[®] SR užívajte po jedle alebo s jedlom, ktoré bolo v ideálnom prípade tepelne upravené.

*RVH - referenčná výživová hodnota

ZLOŽENIE (v 1 tablete):

Mikrokryštalická celulóza 282,82 mg, xantánová guma 54 mg, bisglycinát zinku (15 mg Zn) 53,28 mg, glukonát zinku (5 mg Zn) 37,6 mg, citrát zinku (5 mg Zn) 16 mg, stearan horečnatý 5,4 mg, oxid kremičitý 0,9 mg.

Potahové látky: Bazický kopolymér metakrylátu 9 mg, mastenec 8,37 mg, polyetylén glykol 1,08 mg, indigotín 0,34 mg, oxid kremičitý 0,3 mg, hydrogenuhličitan sodný 0,27 mg, laurylsulfát sodný 0,13 mg.

UPOZORNENIE:

Odporúčaná denná dávka sa nesmie presiahnuť. Udržujte mimo dosahu malých detí.

Výživový doplnok sa nesmie používať ako náhrada pestrej a rozmanitej stravy. Zdravý životný štýl a vyvážená strava sú základom zdravia. Skladujte pri izbovej teplote 15 - 25 °C. Výživový doplnok nie je vhodný pre deti do 6 rokov.

Distribútor:

S&D Pharma SK, s.r.o. Farebná 32, 821 05 Bratislava, Slovensko

Netto váha: 28,35 g

01.2022A_SK_IFU

www.trizin.sk